

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 29-4-77415485

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION "des Pays de la Loire"

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

Maine-&-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée, Mayenne

SERVICE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative rue Dupetit-Thouars 49043 ANGERS CEDEX

Téléphone n° 88.06.15, Poste 571

66.21.32

BULLETIN N° 90 D'AVRIL 1977 - TOUS DÉPARTEMENTS P 1

ARBRES FRUITIERS

PUCERONS DU POMMIER ET DU POIRIER

Les conditions climatiques sont devenues plus favorables à ces insectes qui se multiplient. En particulier, les pucerons verts et les pucerons cendrés sont fréquents dans les vergers de poiriers et de pommiers. Par conséquent, un traitement, dans les vergers où un examen attentif a révélé leur présence, pourra être envisagé dès maintenant.

CHEIMATOBIE

Les chenilles de ce papillon sont localement actives et il y a lieu de s'en méfier. Les vergers de pommiers et de poiriers doivent donc être surveillés attentivement. Un traitement pourra également être envisagé dès maintenant. Les arboriculteurs dans ce cas, auront intérêt à se servir d'un insecticide, à la fois actif contre les pucerons et la cheimatie.

PSYLLE DU POIRIER

Des larves sont visibles depuis un certain temps. Dans les vergers attaqués en 1976, et en particulier dans ceux où de la fumagine a été observée sur les bois, une intervention pourra être exécutée dès maintenant.

ARAIGNEE ROUGE

Les oeufs d'hiver sont extrêmement rares dans la majorité des vergers. Ils commencent à éclore. Mais, même dans les rares vergers où ils sont suffisamment nombreux pour justifier une intervention, il est encore trop tôt pour intervenir.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Les ascospores sont toujours très peu nombreuses et aucune tache de ces maladies n'a été signalée. D'autre part, les conditions climatiques actuelles sont très peu favorables aux tavelures. Dans les vergers où un traitement insecticide doit être exécuté, il est toutefois conseillé d'ajouter un fongicide à la bouillie insecticide.

Dans le cas où le traitement insecticide n'est pas urgent, le renouvellement de la protection anti-tavelures pourra être repoussé au courant de la semaine du 25 au 30 Avril.

OIDIUM DU POMMIER

Les conditions climatiques sont plus favorables à cette affection. D'autre part, la végétation étant plus active, des surfaces sensibles sont apparues. Sur les variétés sensibles, il est donc conseillé d'ajouter un fongicide anti-oidium à la bouillie anti-tavelure.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER

Le risque d'attaque est faible. Toutefois, un nouveau traitement pourra être exécuté dans le courant de la semaine du 25 au 30 Avril.

.../...

14

PROTECTION DES ABEILLES

Il est rappelé que, seuls les insecticides et acaricides suivants, non toxiques pour les abeilles, peuvent être utilisés pendant la floraison des arbres fruitiers :

BROMOPHOS - BROMOPROPYLATE - CHINOMETHIONATE - CYHEXATIN - DIALIPHOS - DICOFOL - DIETHION - ENDOSULFAN - PHOSALONE - PIRIMICARBE - PYRETHRINES SYNERGISEES - ROTENONE - TETRADIFON - TETRASUL - TOXAPHENE et POLYCHLOROCAMPHANE.

Les arboriculteurs devront attacher une importance particulière à ce problème, en raison du risque de mauvaise pollinisation.

VIGNE

ARAIGNEE ROUGE

Les oeufs d'hiver sont extrêmement rares dans l'ensemble des vignobles. Les premières larves sont apparues. Mais même dans les très rares parcelles où une intervention pourrait éventuellement se justifier, il est encore trop tôt pour intervenir.

EXCORIOSE

Les gelées vont avoir pour effet, dans certaines parcelles, de retarder l'apparition des stades de végétation auxquels la vigne est sensible à l'excoriose. Les viticulteurs devront en tenir compte, (se reporter aux notes du 28 Mars et du 5 Avril).

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
des " PAYS DE LA LOIRE "

G. RIBAUT.

TIRAGE DU 21 AVRIL 1977